

“El tabaco como factor de riesgo en los tejidos periodontales.”

E.E., M.E.O. Ricardo Treviño Elizondo, PhD Miguel Ángel Quiroga García,
PhD Fanny López Martínez, M.S.P. Guillermo Cruz Palma.

Facultad de Odontología
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Introducción:

El tabaco es el factor más importante en la etiología de la enfermedad periodontal después de la placa bacteriana; pero a pesar de toda la información que se conoce hoy en día, no se ha logrado concientizar a las personas consumidoras de éste.

Materiales y métodos: Analizar la percepción del consumo de tabaco y relación con su afección en los tejidos periodontales.

Resultados: Se pudo observar que predominó el género masculino en un 58%; las personas que más han notado tener cambios en el periodonto, encías inflamadas, movilidad dental, mal aliento, son los fumadores con más de 5 años; el 50% de las personas encuestadas no está consciente del daño que produce el cigarro en los dientes y en la cavidad oral en general.

Conclusión: Se puede decir que la mayoría de los encuestados han notado cambios en su cavidad oral, sin embargo se concluye que es necesario implementar más y mejores programas de educación, mayor difusión cultural y publicidad para concientizar a la población consumidora de tabaco acerca del daño que causa el consumo de éste en los tejidos periodontales y de esta manera se encuentren alerta de las manifestaciones orales que pueden presentar y cuiden su salud.

Bibliografía:

García Linares S. (2014). Nueva clasificación de la enfermedad periodontal. *Odontología sanmarquina*, 6(11), 48-50.

González Ay O; Bascones Martínez A.; Villarroel Dorrego M. (2009). Alteración del pH salival en pacientes fumadores con enfermedad periodontal. *Avances en periodoncia*, 21, 2.

González Ramos RM; Bárbara Herrera López I; Osorio Núñez M; Madrazo Ordaz D. (2010). Principales lesiones bucales y factores de riesgo presentes en población mayor de 60 años. Revista Cubana de Estomatología, 47(1), 105-114.

Johnson GK.; Guthmiller JM. (2008). Impacto del tabaquismo en la enfermedad y el tratamiento periodontales. Periodontology 2000 (Ed Esp), 19, 120-128.

Kuri PA, González JF, Gutiérrez MJ, Cortés M. (2006) Epidemiología del tabaquismo en México. Salud pública Méx.48 (1), 91-98.

Lavielle Sotomayor, P; Sánchez Pérez P; Pineda Aquino, V; Amancio Chassin O. (2012). Impacto de las características familiares sobre el consumo de tabaco en los adolescentes. Rev Med Hosp Gen Méx, 75(2), 84-89.

Manjunath BC; Praveen K; Chandrashekar BR; Rani RM; Bhalla A. (2011). Periodontal infections: A risk factor for various systemic diseases.. India. Natl Med J. 24, 214-219.

El presente resumen forma parte del suplemento "Memorias del Primer Concurso de Carteles del Colegio de Endodoncia de Nuevo León, A. C." es responsabilidad de los organizadores de dicho evento, la Revista Mexicana de Estomatología es ajena al contenido científico, metodológico y de autoría de cada uno de los resúmenes que se presentan. El Suplemento se publica como apoyo a las agrupaciones de profesionales, profesionistas, estudiantes, maestros e instituciones educativas y/o de servicio en la difusión de sus trabajos.